



Bij het transport van duiven is er een verhoogde concentratie van duizenden levende wezens, dragers van pathogene microorganismen, verzameld in een kleine ruimte of beperkte omgeving die de kans tot ontwikkeling van microbiële infectie sterk verhoogt.

Op het moment dat de duiven ingekorfd worden en van de gemeenschappelijke drinkbakjes drinken, wordt een microbiële bron gevormd waaraan alle duiven worden blootgesteld.

Elke duif die terugkomt is in principe een potentiële drager van mogelijke infecties die ook andere duiven kan besmetten.

Deze situaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden.

wij stellen u HexaPlus voor. Een produkt met een wijde microbicide werking en die werkt bij direct contact. Het wordt niet in het systeem geabsorbeerd en heeft een efficiënte werking tegen trichomonas, bacteriën, schimmels en virussen.

Gebruik van HexaPlus

- om trichomonas te behandelen en te elimineren
- behandeling tegen schimmels (candidiase)
- om schadelijke bacteriën in het spijsverteringskanaal te elimineren.
- vermijden van infecties van duiven die van een wedstrijd terugkomen.
- verspreiding van ziektes vermijden (via het drinkwater of van aangekochte duiven of duiven die pas in een voor hen nieuw duivenhok binnenkomen.
- heeft een snelle werking indien het toegepast wordt naast een behandeling met antibiotica (werkt direct bij intern contact van zodra de antibiotica geabsorbeerd wordt)
- na een behandeling met antibiotica, waardoor de intestinale flora uit balans gebracht wordt en waardoor candidiase gemakkelijk ontwikkelt.

- bij virale aandoeningen vermijdt hexa plus de ontwikkeling van schadelijke bacteria van het spijsverteringsstelsel en voorkomt secundaire infecties.
- bij de desinfectering van materiaal en toestellen, water en mengelingen.
- drinkwater dient regelmatig verversst te worden

Gebruiksaanwijzing van HexaPlus

- bij aankomst van een wedstrijd en na traingen
- bij eerste ziektesymptomen (1 a 2 dagen) ter preventie van infecties.
- na ziektebehandelingen met antibiotica.

(opmerking: HexaPlus mag continu toegepast worden)

- tijdens de kweek, reproductie- en ruiperiode, 1 a 2 maal per week.
- verwijderen van trichomonas
- bij de onmogelijkheid om het drinkwater dagelijks te verversen.

Vergelijkbare voordelen

- werkt bij contact, directe werkingen wordt niet geabsorbeerd.
- overlaad het organisme niet.
- elimineert trichomonas
- wijd en langdurig werkingsspectrum
- economosch daar het slechts weinig dagen dient gebruikt te worden.

Dossificatietabel

Toepassingsgebied	Dosis per Liter drinkwater	Aantal dagen behandeling
Ornitologie	6 ml	1a3
Tricomonida	15 ml	1 a 3
Bactericide	10 ml	5
Fungicide	10 ml	5
Candidiase	10-15 ml	3 a 5
Desinfectie van materiaal (drink-en eetbakken)	50-70 ml	Minimum wekelijks
Desinfectie water	5 ml	Continu
Desinfectie mengelingen	10 ml	Continu
Vermijden van ziekteverspreiding via het drinkwater	10 ml	Tot verdwijnen van ziektesymptoom
Vuil water in drinkbakken	5 ml	Continu